



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

نام دارو	دسته دارویی	موارد مورد استفاده	فارماکوکینتیک دارو	عوارض دارو	مراقبت های دارویی	تداخلات غذا و دارو
پرازوسین	مهار کننده آلفا آدرنرژیک	درمان فشارخون و هایپر پلازی خوش خیم پروستات	از طریق گوارش جذب می شود منابولیسیم کبدی دارد	تپش قلب سرگیجه خشکی دهان سردرد خواب آلودگی تهوع ضعف افت فشارخون احتقان بینی خونریزی از بینی	در بارداری ممنوع است	یا داروی برومپریدول منع مصرف دارد با غذای خاصی تداخل ندارد
ترازوسین	مهار کننده آلفا آدرنرژیک	درمان فشارخون و هایپر پلازی خوش خیم پروستات(به شل شدن عضلات پروستات کمک می کند-باعث کاهش علائم ادرار مکرر یافوری می شود)	از طریق گوارش جذب می شود منابولیسیم کبدی دارد	سرگیجه درد قفسه سینه غش تپش قلب تنگی نفس ادم اندام های تحتانی	در بارداری ممنوع است	سیلدناقیل وراپامیل ایبوپروفن ناپروکسن تامسولوسین داروهای دیورتیک
فیناستراید	مهار کننده آلفا آدرنرژیک	در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات به کار می رود. به این صورت که از بزرگی پروستات جلوگیری کرده و موجب تسهیل در دفع ادرار می گردد.	از طریق گوارش جذب می شود منابولیسیم کبدی دارد	کاهش میل جنسی افت فشارخون سرگیجه حساس شدن پستان-در موارد نادر افسردگی	در بارداری ممنوع است حتی دست زدن این دارو در زنان باردار ممنوع است	تداخل غذایی ندارد
فنوکسی بنزامین	مهار کننده آلفا آدرنرژیک	درمان فشارخون و هایپر پلازی خوش خیم پروستات	از طریق گوارش جذب می شود. متابولیسیم دارو کلیوی می باشد	سرگیجه غش خواب الودگی	در بارداری ممنوع است در بیماران نارسایی قلبی و کلیوی نباید تحویز شود	تداخل غذایی ندارد یا داروی برومپریدول نمی توان مصرف کرد



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

	<p>در بیماران که حساسیت به پنی سیلین - بیماران کلیوی - کبدی - بیماران با حساسیت بالای معده و روده</p>	<p>کهیر-واکنش آلرژیک - تهوع - استفراغ</p>	<p>از طریق گوارش جذب می شود منابولیسیم کبدی دارد</p>	<p>یک آنتی بیوتیک که برای درمان عفونت های باکتریایی مختلف مانند عفونت های دستگاه تنفسی، ادراری، گوارشی و پوستی به کار می رود. و نیز به عنوان آنتی بیوتیک پیش گیری کننده قبل از جراحی</p>	<p>آنتی بیوتیک - سفالوسپورین</p>	<p>سفاژولین</p>
<p>تداخل دارو با غذا ذکر نشده است - اما با سایر آنتی بیوتیک ها سفالوسپورین - واکسن وبا ... باید با احتیاط استفاده شود.</p>	<p>در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود. تزریق زیر جلدی جنتامایسین توصیه نمی شود، زیرا دردناک خواهد بود</p>	<p>کهیر - افزایش آنزیم های کبدی - سرگیجه - خواب آلودگی - تهوع - وجود پروتین در ادرار - کاهش ادرار - وزوز گوش ...</p>	<p>از طریق گوارش جذب نمی شوند. بهترین نوع و سریع ترین آن تزریق عضلانی است. دفع آن کلیوی است - نیمه عمر آن ۲ تا ۴ ساعت است .</p>	<p>درمان عفونت های شدید -</p>	<p>آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی</p>	<p>جنتامایسین</p>
<p>مهم ترین تداخلات دارویی با الکل و داروهای حاوی اتانول است - فنی توئین - فتوباریتال - وارفارین - لیتیم</p>	<p>در بیماران با مشکلات کلیوی - کبدی و بیماران که مصرف الکل دارند با احتیاط مصرف شود در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود</p>	<p>اسهال - استفراغ - سردرد - خواب آلودگی - تیره شدن ادرار - خشکی واژن - کهیر - بی اشتها</p>	<p>از طریق کلیه ها دفع می شود</p>	<p>برای درمان بیماران با منشا باکتری های بی هوازی</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>مترونیدازول</p>



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

<p>مصرف همزمان با داروهای ضد اسهال مانند دیفنوکسیلات و ترکیبات تریاک، ممکن است اسهال ناشی از مصرف کلیندامایسین را با کاهش دفع توکسین های باکتری، تشدید یا طولانی کند.</p>	<p>در نوزادان استفاده نشود. در بارداری با احتیاط استفاده شود. در طول درمان cbc چک شود.</p>	<p>کهیر - اسهال-تهوع - کاهش اشتها-سردرد ...</p>	<p>دفع دارو از طریق کلیه و قسمتی از طریق مدفوع می باشد. نیمه عمر دارو ۲ تا ۳ ساعت می باشد.</p>	<p>عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس واژینیت باکتریایی توکسوپلاسموز (مغزی یا چشمی) در بیماران دچار نقص ایمنی پنومومنی</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>کلیندامایسین</p>
<p>-</p>	<p>در بیماران مبتلا به عیب کارکبد یا کلیه ، کاهش مقدار مصرف این دارو ضروری است. در زنان باردار با احتیاط استفاده شود.</p>	<p>اسهال - راش پوستی-گرگرفتگی- تپش قلب-افزایش کراتینین سرم- تنگی نفس شدید</p>	<p>نیمه عمر دارو بین ۶ تا ۹ ساعت است از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود</p>	<p>این دارو قبل از اعمال جراحی و به منظور پیشگیری از عفونت نیز مصرف می شود.</p>	<p>آنتی بیوتیک - ضد باکتری</p>	<p>سفتریاکسون</p>



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

<p>این دارو با داروی وارفارین - داروهای ملین - داروهای محرک سیستم عصبی در تداخل است. از نظر مواد غذایی : با کلسیم و آهن باید حداقل ۲ ساعت فاصله داشته باشد.</p>	<p>در بیماران کلیوی و زنان باردار با احتیاط مصرف شود. احتمال آسیب به تاندون ها به خصوص تاندون آشیل را دارد.</p>	<p>تهوع - سردرد - سرگیجه -</p>	<p>دفع دارو کلیوی می باشد.</p>	<p>درمان عفونتهای سیستم ادراری - پنومونی - پیلونفریت</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>سیپروفلوکساسین</p>
<p>با واکسن - داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و آمینوگلیکوزیدها در تداخل است.</p>	<p>تزریق این دارو به صورت وریدی آهسته (معمولا طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه) می باشد و در صورتی که سرعت تزریق افزایش یابد، ممکن است عوارض جدی برای بیمار داشته باشد. (از جمله شوک و سندروم مرد قرمز که در آن بدن بیمار قرمز و کیود می گردد-). در صورت ناراحتی کلیوی - اختلالات شنوایی با احتیاط مصرف شود این دارو سمیت کلیوی و کبدی دارد. با داروی دیگری در هنگام تزریق ترکیب نشود.</p>	<p>کهیر - خارش - تنگی نفس - تورم زبان - اسهال - نفخ - سردرد - کمر درد - ورم اندام تحتانی - افت فشار خون</p>	<p>دفع کلیوی دارد</p>	<p>در باکتری های مقاوم و گرم منفی استفاده می شود.</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>وانکومايسين</p>



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

<p>با واکسن ها و فرآورده های والپرات تداخل دارد</p>	<p>در صورت حساسیت شدید به هر یک از داروهای بتالاکتام مصرف این دارو ممنوع است در بارداری با احتیاط مصرف شود</p>	<p>اسهال - یبوست-آمبولی - افزایش فشارخون - درد قفسه سینه</p>	<p>دفع کلیوی است</p>	<p>بیشتر در باکتری های گرم منفی و مثبت کاربرد دارد مانند آپاندیسیت - پنومونی و...</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>مروپنم</p>
<p>تداخل دارویی با وارفارین دارد .</p>	<p>موقع تزریق آهسته انجام شود و با داروی دیگری ترکیب نشود.</p>	<p>اسهال خفیف-کرامپ شکمی - تهوع- استفراغ-</p>	<p>دفع کلیوی است</p>	<p>سفتی زوکسیم در درمان عفونت های مفصل و استخوان ، سوزاک ساده ، عفونت های داخل شکم، مننژیت ، سپتی سمی باکتریایی، عفونت های بافت نرم و پوست و عفونت های باکتریایی مجرای ادرار مصرف می شود.</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>سفتی زوکسیم</p>
<p>در صورت وجود حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آنها یا پنی سیلامین یا ابتلای بیمار به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.</p>	<p>این دارو باعث مثبت کاذب در آزمایش کومبس و قند می شود. با هیچ دارویی مخلوط نشود.</p>	<p>خارش - افزایش کراتنین-اسهال</p>	<p>دفع کلیوی است.</p>	<p>درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مانند :پنومونی-جراحی های شکمی و...</p>	<p>آنتی بیوتیک</p>	<p>سفتازیدیم</p>



داروهای شایع در بخش جراحی و مراقبت های دارویی



کد سند: EDNO003 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰ شماره ویرایش: ۰۰

در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود	در هنگام مصرف آب به میزان کافی بنوشید.	این دارو سمیت کلیوی- سمیت در شنوایی دارد در بارداری منع مصرف دارد	دفع کلیوی است	بیشتر بر روی باکترهای گرم منفی تاثیر دارد.	آنتی بیوتیک	آمیکاسین
--	--	---	---------------	--	-------------	----------

منبع : MED SCAPE .COM